


إنتاج الفاصوليا

أ. د. أحمد عبد المنعم حسن



إنتاج الفاصوليا

أ. د. أحمد عبدالمنعم حسن

الأستاذ بكلية الزراعة – جامعة القاهرة

نشرة إرشادية أعدت عن طريق شركة وادى النيل للتنمية الزراعية لمشروع الشمس/ هيئة كير الدولية – مصر/هيئة المعونة الأمريكية.

Green Bean Production

Ahmed A. Hassan

Professor of Vegetable Crops Faculty of Agriculture, Cairo University

An extension bulletin prepared by NVG for ELSHAMS Project, Care Internationala-Egypt, USAID 2005.

إنتاج الفاصوليا

تقتصر المعلومات الواردة فى هذه النشرة على إنتاج الفاصوليا الخضراء من الأصناف القصيرة فى الأراضى الصفراء والسوداء، مع الرى بطريقة الغمر.

الأصناف

تقسم أصناف الفاصوليا الخضراء حسب سمك القرن إلى أربعة طرز، كما يلى:
١ - أصناف فائقة الرفع:

تكون قرون هذا الطراز رفيعة جداً، حيث يقل قطرها عند الحصاد لأجل الاستهلاك عن ٦,٥ مم. وهى تزرع للتصدير إلى الأسواق الفرنسية والبلجيكية. ويتعين حصاد قرون هذه الأصناف يومياً، وتعبئتها حقلياً، مع نقلها بأسرع ما يمكن إلى محطات التعبئة لتبريدها أولاً.

ومن أمثلة أصناف هذا الطراز: أيمى - سامنثا - مورجان - كوبى - رويال نل - سونيت - جوليا - دول - توكان - مونيل - جارونيل - ديسيل - سليو - كالبرا.

٢ - أصناف رفيعة جداً:

يتراوح سمك القرون فى أصناف هذا الطراز فى المرحلة المناسبة للاستهلاك بين ٦,٥، و ٨ ملليمترات، ويمكن حصادها كل يومين أو كل ثلاثة أيام فى الجو البارد.

ومن أمثلة أصناف هذا الطراز: بوليستا - نرينا - جيزة ٤ - سلندريت - فلكسو - تيما - أرجس - بريميرا.

٣ - أصناف رفيعة:

يتراوح سمك القرون فى أصناف هذا الطراز فى المرحلة المناسبة للاستهلاك بين ٨، و ٩ ملليمترات، ويمكن حصادها كل ثلاثة أيام أو كل أربعة أيام فى الجو البارد.

ومن أمثلة أصناف هذه المجموعة: بوليستا - جيزة ٤ - أرجس - تيما - برونكو - جيزة ٥.

٤ - أصناف سمكية (بوبى):

تتضمن هذه المجموعة الأصناف التى يزيد قطرها المناسب عند الحصاد لأجل الاستهلاك الأخضر عن ٩ ملليمترات، ويمكن حصادها كل ٤-٥ أيام فى الجو الدافئ، وكل ٧-١٠ أيام فى الجو البارد.

ومن أمثلة أصناف هذه المجموعة: برونكو - جيزة ٥ - جيزة ٣ - جيزة ٣١٧ - ماتادور - بربو - سيفيل.

٥ - أصناف طراز الرومانو:

تتميز قرون هذا الطراز بأنها مبطة وعريضة نوعاً ما (١,٢-٢ سم)، ولكنها أقرب كثيراً فى الشكل العام من قرون طراز البوبى غير الأسطوانية.



ومن أمثلة أصناف هذا الطراز: روما ٢، وجينا، وبريديرو، ورومانو ٢٦.

٦ - أصناف الزراعات المحمية:

يوجد منها ما يلي:

أ - طراز البوبى .. مثل: سربو - نوفاكس.

ب - طراز الهلدا (أو المنجتو): تتميز قرون هذا الطراز بأنها عريضة جداً (٢-٢,٥ سم) وطويلة جداً (٢٠-٣٠ سم)، ومن أمثلتها: هيلدا.

التربة المناسبة

يمكن زراعة الفاصوليا فى جميع أنواع الأراضى باستثناء الثقيلة جداً. ويجب عدم زراعة الفاصوليا فى كل من الأراضى الملحية، وتلك الملوثة بالنيماتودا وفطريات التربة المسببة لأعفان الجذور.

التقاوى وإعدادها للزراعة

تختلف كمية البذور التى تلزم لزراعة فدان من الفاصوليا باختلاف حجم بذور الصنف المستعمل فى الزراعة، وتتراوح الكمية المناسبة حوالى ١٨-٢٠ كجم للفدان بالنسبة للصنف بوليستا والأصناف الأخرى المماثلة له فى حجم البذور، ولكنها تزداد حتى ٣٠ كجم بالنسبة للأصناف ذات البذور الكبيرة الحجم، مثل جيزة ٣.

وتعد البذور للزراعة بإحدى معاملتين (لأنهما يتعارضان مع بعضهما البعض)، كما يلي:

١ - المعاملة بالمطهرات الفطرية:

تجرى المعاملة بالمطهرات الفطرية قبل الزراعة مباشرة. تندى البذور أولاً بقليل من الماء، وذلك للمساعدة فى التصاق المطهرات بسطح البذور.

تستعمل فى المعاملة: (١ جرام ريدوميل بلص أو ١ سم^٣ بريفيكور إن) + (١,٥ جم ريزوليكس/ثيرام أو ١,٥ جم مونسرين) + (١ جم توبس إم ٧٠٪ أو ١ سم^٣ تكتو ٤٥٪) لكل كيلوجرام واحد من البذرة.

٢ - المعاملة بالعقدين (بكتيريا الرايزيوم المثبتة لآزوت الهواء الجوى):

تذاب ٢-٣ معلقة سكر فى ١,٥ كوب من الماء، ثم يضاف إليه محتويات كيس من العقدين، ويقلب جيداً.



جذور فاصوليا تظهر بها عقد الرايزومي المفيدة للنبات.

تفرش التقاوى المراد تلقيحها على بلاستيك نظيف في مكان مظلل، ويرش عليها بانتظام معلق العقدتين في المحلول السكري، ويقلب جيداً مع التقاوى، حتى تغطي البذور كلها بالعقدتين.

تترك التقاوى المعاملة بعد ذلك لتجف في الظل لمدة حوالى ساعة، ثم تزرع فوراً.

تروى الأرض بعد الزراعة مباشرة في حالة الزراعة العفير، أو بعد اكتمال الإنبات في حالة الزراعة الحراثي.

أما إذا كانت البذور معاملة بالمظهرات الفطرية فإنها تزرع مباشرة، بينما يضاف العقدتين إلى التربة مباشرة، وتجرى المعاملة في هذه الحالة بخلط ٦٠٠-٨٠٠ جم (٣-٤ أكياس) من العقدتين مع حوالى ٥٠ كجم من الرمل الناعم أو التربة الصفراء، مع ترطيب المخلوط بالماء. يكفي هذا المخلوط لمعاملة فدان. يضاف هذا المخلوط سراً إلى جوار خط الزراعة ويغطى بالتربة، ثم يروى الحقل بعد ذلك مباشرة.

تجهيز الأرض والزراعة

تضاف الأسمدة العضوية والكيميائية أثناء تجهيز الأرض للزراعة، ثم تقام الخطوط بعرض ٦٠ سم (١٢ خط بالقصبتين).

تعمق الخطوط جيداً، مع الاهتمام بمسح الريشة التى تستعمل في الزراعة، وهى الريشة الشرقية أو الجنوبية (القبليّة) عندما تكون الزراعة في الجو البارد، والريشة الشمالية (البحرية) أو الغربية عندما تكون الزراعة في الجو الدافئ.

وتكون الزراعة بإحدى طريقتين، كما يلي:

١ - الطريقة العفير:

تزرع البذور وهي جافة في أرض جافة على عمق ٣-٤ سم، وتلك هي الطريقة المناسبة للأراضي الصفراء.

٢ - الطريقة الحراثي:

تزرع البذور وهي جافة في أرض سبق ريها، ثم تركت حتى وصلت إلى درجة الجفاف المناسبة (يوم واحد إلى يومين في الأراضي الصفراء، ويومين إلى أربعة أيام في الأراضي الثقيلة). وتكون الزراعة على عمق ٣-٤ سم، ثم تغطي البذور بالثرى الرطب، ثم بالتراب الجاف.

وفي أى من الطريقتين تكون زراعة البذور إما سرًا كل ٥-٧ سم، وإما في جور بمعدل بذرتين في الجورة كل ١٠-١٤ سم، وذلك عند حد الماء في بداية الثلث العلوى من ريشة الزراعة. ويفضل اتباع طريقة الزراعة في جور في الأراضي الثقيلة.

وفي حالة الزراعة بطريقة السرّ، يقوم أحد العمال بفتح شق بعمق ٥ سم عند بداية الثلث العلوى من ريشة الخط، ثم يقوم عامل ثان بسر البذور على الأبعاد المناسبة، بينما يقوم عامل ثالث بالترديم عليها كما أسلفنا بيانه، وقبل أن تجف التربة في شق الزراعة.

مواعيد الزراعة

- تكون زراعة الفاصوليا الخضراء في محافظات الصعيد في المواعيد التالية:
- من ٢٠ يناير إلى آخر فبراير في مركزى العياط والبدرشين بمحافظة الجيزة.
- من ١٥ أغسطس إلى ١٥ سبتمبر في كل من الفيوم ومركز العياط بالجيزة.
- خلال شهر نوفمبر في منطقة برقاش بمحافظة الجيزة.
- من ١-١٥ سبتمبر في كل من بنى سويف والمنيا وأسيوط.
- من ١٥ سبتمبر إلى ١٠ أكتوبر في سوهاج.
- من ١-١٥ أكتوبر في قنا والأقصر.
- خلال شهر أكتوبر في شمال أسوان، وحتى آخر نوفمبر حول بحيرة ناصر.

عمليات الخدمة

الترقيع

يتم ترقيع الجور الغائبة بعد رية المحاية والجفاف المناسب، كما يجرى الخف - إذا لزم الأمر - بعد تمام الإنبات، وقبل رية المحاية، على أن يترك نبات واحد أو نباتان بكل جورة.

العزيق

تعزق حقول الفاصوليا من ٣-٤ مرات، تكون مواعيدها بعد تمام الإنبات، ثم كل حوالى ثلاثة أسابيع بعد ذلك، مع مراعاة ما يلي:

- ١ - يجب أن يكون العزيق القريب من النباتات سطحياً حتى لا تقطع الجذور.

٢ - نقل جزء من تراب الريشة البطالة إلى الريشة العمالة حتى تصبح النباتات فى وسط الخط بعد العزقة الثالثة.

٣ - يراعى إجراء العزيق بعد زوال الندى للحد من انتشار الأمراض.

الرى

يختلف توقيت رى الفاصوليا وعدد مرات الرى باختلاف طريقة الزراعة (عفير أم حراثى)، وطبيعة التربة (صفراء أم سوداء).

ففى الزراعة العفير يروى الحقل بعد الزراعة مباشرة، ثم بعد اكتمال الإنبات، بينما لا يروى الحقل فى حالة الزراعة الحراثى إلا بعد اكتمال الإنبات. وفى كلتا الطريقتين للزراعة يجب عدم التشبث بقاعدة عدم الرى قبل اكتمال الإنبات إذا كانت التربة شديدة الجفاف فى الوقت الذى لم يكتمل فيه الإنبات، حيث يمكن إعطاء الحقل رية سريعة "على الحامى" تصل فيها المياه إلى البذور بالنشع. هذا إلا أنه يمكن تأجيل هذه الرية - على الرغم من جفاف الطبقة السطحية من التربة، مع عدم ظهور النباتات - إذا تبين بالكشف على البذور فى التربة ظهور الجذير فيها؛ إذ إنه يتعمق سريعاً فى التربة؛ ليحصل على الماء من على عمق قد يصل إلى ١٠ سنتيمترات فى بداية الأمر.

وبعد الرية الأولى يحتاج المحصول إلى ٣-٤ ريات أخرى فى الأراضى السوداء، وإلى نحو ٦-٨ ريات فى الأراضى الصفراء.

يساعد تأخير الرية الأولى بعد الزراعة إلى تجذب عفن البذور النابتة، مع المساعدة على تعمق الجذور فى التربة.

هذا .. ويؤدى نقص الرطوبة الأرضية قبل الإزهار مباشرة، أو أثناء مرحلة الإزهار إلى نقص المحصول بشدة، ويؤدى نقصها أثناء نمو القرون إلى تكوين قرون مشوهة؛ لذا .. يتعين الانتظام فى الرى.

وتؤدى زيادة الرطوبة الأرضية خلال موسم الحصاد - إلى كثرة النمو الخضرى، وتأخير النضج، وتعفن القرون السفلى.

التسمير

تسمد حقول الفاصوليا الخضراء بالمعدلات التالية للفدان:

أولاً: قبل الزراعة:

- ٢٠ م^٣ سماد بلدى قديم متحلل (إن أمكن).

- ٢٠٠ كجم سوبر فوسفات أحادى.

- ١٠٠ كجم سلفات نشادر.

ثانياً: أثناء النمو:

- قبل الرية الأولى بعد اكتمال الإنبات:

٥٠ كجم نترات أمونيوم + ٥٠ كجم ماجنم أو فوسفات أحادى الأمونيوم.

– قبل الريّة الثانية فى الأراضى السوداء أو الريّة الثالثة أو الرابعة فى الأراضى الصفراء.

٥٠ كجم نترات أمونيوم + ٥٠ كجم سلفات بوتاسيوم.

– قبل الريّة الثالثة فى الأراضى السوداء أو الريّة الخامسة أو السادسة فى الأراضى الصفراء.

٥٠ كجم نترات أمونيوم + ٥٠ كجم سلفات بوتاسيوم.

وبالإضافة إلى ما تقدم بيانه .. ترش النباتات مرتان بالعناصر الدقيقة بعد نحو ٢٥، و ٥٠ يوم من الزراعة. يستعمل أحد التحضيرات التجارية التى تحتوى على جميع العناصر الدقيقة (الحديد والنحاس والزنك والمنجنيز والبورون والموليبدنيم) بالمعدل الموصى به للتحضير التجارى، مع استعمال الحد الأدنى للمعدل الموصى به فى الرش الأول والحد الأقصى له فى الرش الثانية.

العيوب الفسيولوجية

من أهم العيوب الفسيولوجية للفاصوليا، ما يلى:

١ – لسعة الشمس.

٢ – القرون الخضراء المصفرة (البياض):

تظهر هذه الحالة عند شدة الإصابة بالذبابة البيضاء من السلالة الجديدة (بى)، التى تفرز حورياتها – عند تغذيتها – سماً بطئ الحركة فى النبات يعطى تلك الأعراض، وتؤدى مكافحة الذبابة إلى التخلص من تلك الأعراض فى القرون الجديدة المتكونة.

٣ – التواء القرون حول الجزء الذى يصاب بأضرار الرياح التى تؤدى إلى احتكاك القرون ببعضها البعض وبالأجزاء النباتية الأخرى.

الحصاد والتداول الحصاد

تكون حقول الفاصوليا الخضراء – عادة – جاهزة للحصاد بعد نحو ٥٠-٦٠ يوماً من الزراعة.

يكون الحصاد على أساس قطر القرون، ويتراوح محصول الفدان من القرون الخضراء بين ٣، و ٧ أطنان، ويتوقف ذلك على الصنف وميعاد الزراعة.

وبراعى عند الحصاد، ما يلى:

١ – إجراء الحصاد فى الصباح الباكر بمجرد زوال الندى، حتى تكون درجة حرارة القرون منخفضة نسبياً.

٢ – الحصاد كل يومين إلى ثلاثة أيام فى الأصناف الرفيعة (مثل بوليستا)، وكل ثلاثة إلى سبعة أيام فى الأصناف البوبى (مثل جيزة ٣)، وتكون الفترة الأقصر – من كل فئة صنفية – فى الجو الحار (٢٥-30)، والفترة الأطول فى الجو المعتدل (١٨-20).

٣ – جمع القرون بجزء من العنق (بالسنارة).

٤ – لا يحتفظ بالقرون التى يتم حصادها فى اليمين، ولا يتم الضغط عليها، وإنما توضع مباشرة فى عبوات القطف.

- ٥ - عدم وضع أى قرون غير صالحة للتسويق فى عبوات القطف.
- ٦ - عدم حصاد أى قرون صغيرة أكثر مما ينبغى، وحصاد جميع القرون الصالحة للحصاد بالنبات قبل الانتقال إلى نبات جديد.
- ٧ - نقل المحصول من عبوات القطف إلى عبوات الحقل بلطف حتى لا تجرح القرون، وتفضل أن تكون عبوات الحقل سعة ٥ كجم فقط.
- ٨ - نقل عبوات الحقل سريعاً إلى محطة التعبئة، مع مراعاة تغطيتها أثناء تجميعها ونقلها لتجنب تعريضها لأشعة الشمس المباشرة ولخفض فقدانها للرطوبة.

الفرز

يجرى الفرز اليدوى فى محطات التعبئة - أثناء التعبئة - وذلك باستبعاد القرون الصغيرة جداً، والزائدة النضج، والمصابة بالأمراض والآفات، والمشوهة، والمجروحة، والذابلة، وغير المثلة للصنف، والخشنة الملمس، والمختلفة اللون ... إلخ.

التعبئة للتصدير

تعبأ الفاصوليا لأجل التصدير فى عبوات كرتون مضع مشمع سعة ٣ أو ٥ كجم تكون أبعادها ٣٠ × ٢٠ × ١٢,٥ سم، أو ٤٥ × ٣٠ × ١٢,٥ سم، على التوالى، وبها فتحات طولية جانبية للتهوية لا تقل نسبتها عن ٥٪ من السطح الخارجى للعبوة؛ لى تكون التهوية جيدة، ولا تزيد عن ٧٪ لى لا تتأثر متانتها.

يتم اختيار القرون الصالحة للتصدير بعناية، وتعبأ بطريقة منتظمة، بحيث توضع القرون فى العبوة فى صفين أو ثلاثة، مع توحيد اتجاه أعناق القرون فى كل صف منهم. ويفيد تبطين عبوات الكرتون بورق السوليفان فى تقليل فقد الرطوبة من القرون.

كما يمكن التعبئة فى عبوات المستهلك، وهى عبارة عن أكياس من ورق السوليفان المثقب تتسع لنحو ٢٥٠، أو ٥٠٠ جم من القرون، ثم توضع هذه العبوات داخل الصناديق الكرتونية.

التبريد الأولى

يجرى التبريد الأولى بطريقة السريان الجبرى للهواء، وذلك فى خلال ساعة واحدة إلى ساعتين من الحصاد، علماً بأن القرون تفقد حوالى ٢٪ من رطوبتها خلال الساعة الأولى بعد الحصاد، وترتفع هذه النسبة إلى ٣٪ بعد ساعتين إضافيتين.

يجب أن يكون الهدف من التبريد الأولى هو التخلص من حوالى ٩٠٪ من حرارة الحقل فى خلال ساعة واحدة إلى ساعتين من بداية التبريد، مع استمرار التبريد حتى تصل حرارة الفاصوليا إلى ٦-٧°م.


التخزين

يكون شحن وتخزين الفاصوليا على حرارة ٥-٧°م ورطوبة نسبية حوالى ٩٥٪.

الأمراض والآفات ومكافحتها
تساقط الباورات وأعفان الجذور



عفن الجذور الفيوزاري.



أعراض الإصابة بعفن بثيم الجذري (الحناق).



أعراض الإصابة بعفن زايزكتونيا الجذرى.

تكافح أمراض تساقط البادرات (الخناق) وأعفان الجذور، كما يلي:

- ١ - معاملة البذور بالمطهرات الفطرية، كما أسلفنا بيانه.
- ٢ - معاملة التربة - حول النباتات - بالمطهرات الفطرية ذاتها الموصى بها لمعاملة البذور. يحضر محلول المبيدات باستعمال (١٠٠ جم ريدوميل بلص أو ١٠٠ سم^٣ بريفيكور إن) + (١٥٠ جم ريزوليكنس/ثيرام أو ١٥٠ جم مونسرين) + (١٠٠ جم توبسن إم ٧٠٪ أو ١٠٠ سم^٣ تكتو ٤٥٪) لكل ١٠٠ لتر ماء.
- يضاف محلول المبيدات الثلاثة باستعمال رشاشة بدون فونية عند قاعدة النباتات، على أن يلامس النباتات قبل وصوله إلى التربة. تكون المعاملة قبل الري بيوم أو يومين، أو بعده بيوم أو يومين.
- تجرى هذه المعاملة بعد اكتمال الإنبات، ثم تكرر بعد ذلك بنحو ١٠-١٤ يوم.
- ٣ - المكافحة الحيوية، باستعمال:
 - بلانت جارد ٣ × ١٠^٧ وحدة/مل بمعدل ١٠ سم^٣/لتر ماء.
 - بروموت ٥ × ١٠^٧ وحدة/جرام بمعدل ١٠ جم/لتر.
- ٤ - بالإضافة إلى ما تقدم بيانه من وسائل المكافحة .. يراعى دائماً - قبل وأثناء الزراعة - مراعاة ما يلي:
 - أ - اتباع دورة زراعية ثلاثية تتضمن النجيليات.
 - ب - حرث البقايا النباتية المصابة عميقاً في التربة.
 - ج - تحسين الصرف.
 - د - زراعة الأصناف القادرة على تحمل الإصابة بأى من الفطريات المسببة لأعفان الجذور (مثل فطريات: الفيوزاريوم، والرايزكتونيا، والثيلافيوبيسيس).
 - هـ - الاعتدال فى الري.

العفن الأبيض أو القطنى



أعراض الإصابة بالعفن القطنى على القرون.

تبدأ الإصابة على ساق النبات عند سطح التربة، ولكنها تمتد إلى جميع أجزاء النبات، مكونة عفنًا مائيًا طريًا، لا يلبث أن يغطى بغزل فطرى كثيف قطنى أبيض اللون، تظهر فيه بعد فترة وجيزة الأجسام الحجرية للفطر، وهى سوداء وصلبة وصغيرة الحجم.

ويكافح المرض بمعالجة ما يلى:

- ١ - اتباع دورة زراعية تدخل فيها النجيليات.
 - ٢ - معاملة البذور بالمطهرات الفطرية كما أسلفنا، مع زراعة بذور معتمدة خالية من التلوث الفطرى.
 - ٣ - تجنب الزراعة الكثيفة.
 - ٤ - تجنب الري الغزير.
 - ٥ - الرش بالمبيدات الفطرية المناسبة، كما يلى:
- رش النباتات بالرونيلا بعد نحو شهر من الزراعة أو قبل ذلك فى حالة ظهور الإصابة، بمعدل ١٠٠ جم/لتر ماء، ويكرر الرش كل ١٠ أيام بالتبادل مع التوبسن إم ٧٠ بمعدل ١٠٠ جم/لتر ماء.
- كما تعامل حقول الفاصوليا الخاصة بالتصدير بالتكتو ٤٥٪ بمعدل ٢٠٠ سم^٣/لتر ماء بمجرد عقد القرون.

العفن الفصمى

تصاب البادرات فى قاعدة الساق مبكرة وتموت، وتصاب سيقان النباتات الأكبر فوق مستوى سطح التربة، حيث تظهر بموضع الإصابات تقرحات ذات لون بنى قاتم إلى سوداء. كذلك قد تظهر البقع الفحمية فى كل من القرون والبذور.

ويكافح المرض بمعالجة ما يلى:

- ١ - زراعة بذور خالية من الفطر المسبب للمرض.

- ٢ - معاملة البذور بالمبيدات الفطرية كما أسلفنا بيانه.
- ٣ - الري المنتظم؛ فلا يكون زائدًا، ولا تعرض النباتات لظروف الجفاف.
- ٤ - الرش بالمبيدات الفطرية المناسبة، مثل الروفرال ٥٠٪، والسوميسلكس ٥٠٪.

الصدأ



الإصابة بالصدأ على الأوراق.

يكافح الصدأ وقائيًا بالرش بالكبريت الميكروني بمعدل ٢٥٠ جم/١٠٠ لتر ماء بعد شهر من الزراعة ثم كل ١٠-١٤ يومًا بعد ذلك بالتبادل مع المانكوبر بمعدل ٢٥٠ جم/١٠٠ لتر ماء كذلك.

كما يكافح الصدأ علاجيًا عند ظهور الإصابة، ثم كل ١٠-١٤ يومًا بعد ذلك بالرش بأى من المبيدات التالية بالتبادل.

- سومي إيت بمعدل ٣٥ سم^٣/١٠٠ لتر ماء.
- بلانتافاكس ٢٠٪ بمعدل ١٠٠ سم^٣/١٠٠ لتر ماء.
- سابروول بمعدل ١٥٠ سم^٣/١٠٠ لتر ماء.
- دومارك ١٠٪ بمعدل ٥٠ سم^٣/١٠٠ لتر ماء.

البياض الدقيقي

يكافح البياض الدقيقي بالرش الوقائي بالمبيدات الفطرية المناسبة، مثل:

- دورادو ٢٠٠ بمعدل ١٠ سم^٣/١٠٠ لتر ماء.
- كومولوس إس بمعدل ٢٥٠ جم/١٠٠ لتر ماء.
- الرش الدورى بالكبريت الميكروني بمعدل ٢٥٠ جم/١٠٠ لتر ماء.

اللفحات الأخرى وأعفان القرون الأخرى

من أهم المبيدات التى تستخدم فى مكافحة اللفحات الأخرى وأعفان القرون الأخرى التى تسببها مختلف الفطريات، ما يلى :

- التوبسن إم ٧٠٪ بمعدل ١٠٠ جم/لتر ماء.
- الرونيان بمعدل ١٥٠ جم/لتر ماء.
- المانكوبير بمعدل ٢٥٠ جم/لتر ماء.
- الكوبرافيت.
- الكوسيد.
- السومى أيت.
- الروفرال ٥٠٪.
- السوميسللكس.

اللفحات البكتيرية



أعراض الإصابة باللفحة العادية.

تنخفض الإصابة باللفحات البكتيرية كثيراً فى زراعات الفاصوليا فى مصر؛ نظراً لأنها لا تنتشر إلا فى ظروف كثرة الأمطار وعند الرى بطريقة الرش.

ويمكن تجنب الإصابة بها بزراعة بذور سليمة خالية من البكتيريا المسببة للمرض، مع عدم الرى بطريقة الرش. وإذا ما ظهرت الإصابة فإن علاجها يكون بالرش بالمبيدات النحاسية مثل الكوبرافيت.

الفيروسات

تصاب الفاصوليا بعدد من الفيروسات التى يمكن أن تقضى على النباتات، ومن أهمها: فيروس موزايك الفاصوليا العادى، وفيروس موزايك الفاصوليا الأصفر، وفيروس موزايك الفاصوليا الذهبى.

وتكافح فيروسات الفاصوليا عن طريق زراعة بذور معتمدة خالية من الإصابة، مع الاهتمام بمكافحة الحشرات الناقلة لفيروسات معينة، مثل حشرات الذبابة البيضاء (فيروس موزايك الفاصوليا الذهبى)، والمن (فيروسات موزايك البرسيم الحجازى، وموزايك الفاصوليا العادى، وموزايك الفاصوليا الأصفر، والتفاف الأوراق، وموزايك اللوبيا، وذبول الفول الرومى، وموزايك الخيار، وموزايك البسلة، وموزايك البطيخ).



أعراض الإصابة باللفحة الهالية.



أعراض الإصابة بفيروس موزايك الفاصوليا العادى.



أعراض الإصابة بفيروس موزايك الفاصوليا الأصفر.

النيماتودا

لا تجب زراعة الفاصوليا فى أرض موبوءة بالنيماتودا، وإذا ما كان هناك احتمال كبير لظهور الإصابة تجب معاملة التربة قبل الزراعة بأحد المبيدات النيماتودية المناسبة، مثل:

- فايدت ٢٤٪ بمعدل لترين فى ٦٠٠ لتر ماء للفدان.
- فايدت محبب ١٠٪ بمعدل ٢٠ كجم/فدان.
- فيوردان ١٠٪ بمعدل ٢٠ كجم/فدان.
- نيماكور محبب ١٠٪ بمعدل ٢٥ كجم/فدان.
- راجبى محبب ١٠٪ بمعدل ٢٠ كجم/فدان.
- وفى كل الحالات يروى الحقل بعد المعاملة مباشرة.



جذور فاصوليا مصابة بشدة بنيماتودا تعقد الجذور.

الحفار

يكافح الحفار باستعمال الطعم السام، وهو يتكون من ٣٠٠ سم^٣ هوستاثيون أو ٢٥٠ جم مارشال + ١ كجم شبة + ١٥ كجم جريش ذرة أو نخالة أو رجيع كون + ١ كجم غسل أسود + صفيحة ماء. تخلط المكونات جيداً، ثم يترك المخلوط ليتخمر، ثم يوضع سراً بجوار خطوط الزراعة قبيل الغروب بعد أن تكون الأرض قد رويت صباح نفس اليوم.

الدودة القارضة

تكافح الدودة القارضة باستعمال الطعم السام كما سبق بيانه بالنسبة للحفار، وتكون إضافة الطعم قريباً من النباتات بعد انصراف ماء الري.

يوصى بإضافة الطعم السام بعد رية المحياة مباشرة.

ومن المبيدات المصرح باستعمالها لمكافحة الدودة القارضة: لانيت ٩٠٪، وآفونت ١٥٪، وبانكول ٥٠٪.

المن

من بين بدائل المبيدات الموصى بها لمكافحة المن، ما يلي :

- ١ - بيوفلاي 3×10 وحدة بمعدل ١٥٠ سم^٣/لتر ماء.
- ٢ - إم بيد ٤٩٪ سائل، بمعدل لتر واحد/١٠٠ لتر ماء.
- ٣ - ديترجنت سائل بمعدل ٢٥٠ سم^٣/لتر ماء.
- ٤ - الزيوت المعدنية الخفيفة، مثل كزد أويل، وكيميوسول ٩٥٪ مستحلب، وسوبر مصرونا ٩٤٪ مستحلب، وسوبر رويال ٩٥٪ مستحلب بمعدل لتر واحد للفدان، وزيت ناتيرلو ٩٠٪ بمعدل ٦٢٥ سم^٣/لتر ماء، وكابل ٢.

أما المبيدات المستعملة في مكافحة المن، فهي كما يلي:

- أفوكس ٥٠٪ بمعدل ٥٠ جم/لتر ماء.
- أكتيليك ٥٠٪ بمعدل ٣٧٥ سم^٣/لتر ماء.
- مالاثيون ٥٧٪ بمعدل ١,٥ لتر في ٤٠٠ لتر ماء للفدان.
- أدميرال ١٠٪ مستحلب بمعدل ٥٠ سم^٣/لتر ماء.
- مارشال ٢٥٪ مسحوق قابل للبلل بمعدل ١٥٠ جم/لتر ماء.
- بريمو ٥٠٪ بمعدل ٢٥٠ جم للفدان.
- سيفين ٨٥٪.
- دورسبان ٤٨٪.

الذبابة البيضاء

تفيد بدائل المبيدات التي أسلفنا بيانها تحت المن في مكافحة الذبابة البيضاء كذلك، ومن بين المبيدات التي ذكرناها تحت المن، تفيد - كذلك - في مكافحة الذبابة البيضاء المبيدات: الأكتيليك، والأدميرال، والمالاثيون. ومن المبيدات الأخرى الموصى بها لمكافحة الذبابة البيضاء في الفاصوليا: آفونت، وبانكول ٥٠٪، وديسيس. وتفيد كثيراً في مكافحة الذبابة البيضاء مبيدات: أكثرا، وأدماير.

صانعات الأنفاق

من أهم بدائل المبيدات التي تستعمل في مكافحة صانعات الأنفاق الزيوت المعدنية الخفيفة بمعدل لتر واحد/١٠٠ لتر ماء كل أسبوعين.

أما المبيدات التي تفيد في مكافحة صانعات الأنفاق، فهي:

- فيرتميك ١,٨٪ مستحلب بمعدل ٦٠ سم^٣/لتر ماء.
- أكتيليك ٥٠٪ بمعدل ١,٥ لتر/٤٠٠ لتر ماء.
- أكثرا بمعدل ٢٠ جم/لتر ماء.
- آفونت ١٥٪.
- بانكول ٥٠٪.

فبابة الفاصوليا

تكافح ذبابة الفاصوليا فى العروة الخريفية بالرش الوقائى بمجرد تكامل الإنبات ، ثم كل أسبوعين بعد ذلك حتى يبلغ عمر النبات شهرين ، مع وقف الرش عند التزهير.

ومن أهم المبيدات المستعملة فى مكافحة ذبابة الفاصوليا، ما يلى:

- بانكول ٥٠٪ بمعدل ١٥٠ جم/لتر ماء.
- دبتركس ٨٠٪ بمعدل ١ كجم/فدان.
- ميتازون ٦٠٪ بمعدل ٢٥٠ سم^٣/لتر ماء.
- نصر سيدول ٦٠٪ بمعدل ٢٥٠ سم^٣/لتر ماء.
- سيليكرون ٧٢٪ مستحلب بمعدل ٧٥٠ سم^٣/فدان.
- لانيت ٩٠٪ مسحوق قابل للبلل بمعدل ٣٠٠ جم/فدان.
- باسودين ٦٠٪ مستحلب بمعدل لتر واحد/فدان.
- ديازونكس ٦٠٪ مستحلب بمعدل لتر واحد/فدان.
- سيفين ٨٥٪ قابل للبلل بمعدل ١,٥ كجم/لتر ماء.

الترس

- من أهم المبيدات المستعملة فى مكافحة الترس، ما يلى:
- أيكون بمعدل ٣٥٠ سم^٣/فدان، وبديله المبيد دولف بنفس المعدل.
 - ديسيس.

الديدان

تكافح جميع أنواع الديدان (مثل دودة ورق القطن، والدودة الخضراء، والديدان النصف قياسية، وديدان أبو دقيق البقوليات، ودودة قرون البقوليات) بالوسائل التالية:

- ١ - مكافحة الحيوية بتحصيلات مثل:
 - دايبيل ٢ إكس بمعدل ٢٠٠ جم/فدان.
 - إيكوتيك بيو ١٠٪ مستحلب قابل للبلل بمعدل ٢٠٠ جم/فدان.
 - آجرين بمعدل ٢٥٠ جم/فدان.
- ٢ - مكافحة بالرش بالمبيدات، مثل:
 - ماتش ٥٠٪ مستحلب بمعدل ٢٠٠ سم^٣/فدان.
 - سيليكرون ٧٢٪ بمعدل ٧٥٠ سم^٣/فدان.
 - لانيت ٩٠٪ بمعدل ٣٠٠ جم/لتر ماء للفدان.
 - نيودرين ٩٠٪ بمعدل ٣٠٠ جم/لتر ماء للفدان.
 - ريلدين ٥٠٪ بمعدل لتر واحد/لتر ماء للفدان.
 - دورسبان ٤٨٪.

العنكبوت الأحمر



أوراق فاصوليا مصابة بالأكاروس (العنكبوت الأحمر).



حشرة العنكبوت الأحمر مكبرة.

يكافح العنكبوت الأحمر بالوسائل التالية:

١ - بدائل المبيدات، مثل:

أ - مساحيق الكبريت، مثل السوريل الزراعي (سمارك أو شيخ)، والكبريت الزراعي النصر، والشامة، والكبريدست، وتستعمل جميعها بمعدل ١٠ كجم/فدان.

ب - الرش المنتظم كل ١٠ أيام بالكبريت الميكروني بمعدل ٢ كجم/٤٠٠ لتر ماء.

ج - الرش بالزيوت والبيوفلاي، والإم بيد كما أسلفنا بيانه تحت المن.

٢ - المبيدات، مثل:

- باروك ١٠٪ بمعدل ٢٠ سم^٣/١٠٠ لتر ماء.

- أورتس بمعدل ٥٠ سم^٣/١٠٠ لتر ماء.

- كومولوس إس بمعدل ٢٥٠ جم/١٠٠ لتر ماء.
- تديفول مسحوق بمعدل ١ كجم/فدان.
- تديفول زيتى بمعدل ١,٥ لتر/فدان.
- كالثين ميكرونى ١٨,٥ ٪ بمعدل ١ كجم/فدان.
- كالثين زيتى ١٨,٥ ٪ بمعدل ١,٥ لتر/فدان.

هذا ويمكن — دائماً — استعمال بدائل المبيدات فى أى وقت حتى خلال فترة الحصاد. كذلك يمكن استعمال معظم المبيدات فى المراحل الأولى من نمو النباتات وحتى بداية الإزهار. أما بعد ذلك فإن استعمال المبيدات يخضع لقواعد محددة تتعلق بالفترة التى يتعين مرورها بين المعاملة بالمبيد والحصاد، وهى التى تتراوح بين ١٠، و ١٥ يوماً بالنسبة لغالبية المبيدات الفطرية، وبين ١٥، و ٣٠ يوماً بالنسبة لغالبية المبيدات الحشرية والأكاروسية والنيماطودية.